



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

BUENOS AIRES, 20 dic 2006

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° inc. a) del Decreto n° 1490/ 92 establece que esta A.N.M.A.T. tendrá competencia en todo lo referido a *"el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana."*

Que el artículo 8°, inc. ñ) del Decreto n° 1490/92, establece que esta Administración Nacional está facultada para adoptar las medidas más oportunas para proteger la salud de la población ante la detección de cualquier factor de riesgo relacionado con los productos sustancias, elementos o materiales comprendidos en el Artículo 3° de la mencionada norma.

Que en diferentes países de alta vigilancia sanitaria se han notificado nuevas advertencias de seguridad en medicamentos antiinflamatorios no esteroides tradicionales comúnmente denominados AINES según consta de fojas 2 a 27 entre los que se incluyen a los principios activos Naproxeno, Ibuprofeno y Diclofenac.

Que las mencionadas notificaciones se relacionaron con riesgos de



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

trombosis (infarto agudo de miocardio, Tromboembolismo Pulmonar, ACV) en pacientes tratados con AINES en forma prolongada y en dosis elevadas.

Que en nuestro país hay una gran cantidad de especialidades medicinales que contienen AINES tradicionales como monodroga o asociados a otros principios activos, algunas de ellas registradas con condición de venta “bajo receta”, y otras como “venta libre”, según los términos del Decreto N° 9763/64 reglamentario de la Ley de Medicamentos N° 16.463.

Que resulta necesario la inclusión de advertencias específicas en aquellas especialidades medicinales que contienen Naproxeno, Ibuprofeno y Diclofenac en las concentraciones autorizadas en la condición de “venta libre”.

Que asimismo la Comisión de Determinación de Condición de Venta (CODECOVE), abocada principalmente a la adecuación de los prospectos de Condición de Venta Libre según los lineamientos de la Disposición 7625/97, recomienda la normatización de la información contenida en los prospectos de las especialidades medicinales que contengan Naproxeno, Ibuprofeno y Diclofenac tanto en monodrogas como en asociaciones con otros principios activos.

Que por otra parte y teniendo en cuenta que la Aspirina es un principio activo que pertenece al grupo de los AINES, y sin perjuicio que las advertencias citadas no le resultan de aplicación, cabe en esta oportunidad proceder a la normatización de prospectos de “venta libre” a los fines de armonizar su contenido.

Que la Dirección de Evaluación de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 1490/92 y del Decreto N° 197/02.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Los laboratorios titulares de certificados de Especialidades Medicinales que contengan como principio activo NAPROXENO, DICLOFENAC , IBUPROFENO (adultos y de uso pediátrico) y ASPIRINA, solos o en asociaciones, autorizados bajo la Condición de Venta Libre, deberán incluir en los prospectos la información contenida en los Anexos I, II , III y IV que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2°.- Los laboratorios titulares de certificados de especialidades medicinales a los que se hace referencia en el artículo precedente, deberán adecuar los respectivos prospectos dentro del plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de la entrada en vigencia de la presente disposición, debiendo presentar los proyectos de los nuevos prospectos (por triplicado) con la inclusión de la información contenida en los Anexos I, II , III y IV que forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 3°.- El incumplimiento de la presente disposición hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en la Ley 16.463 y en el Decreto 341/92.

ARTICULO 4°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5º.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación. Notifíquese a las Cámaras CAEME, CAPROFAC, CAPGEN CAPEMVEL, CEDIQUIFA, CILFA, COFA, COMRA, COOPERALA, SAFYBI. a la Confederación Farmacéutica (COFA) y a Confederación Médica (COMRA). Gírese copia autenticada a la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales.

Expediente N° 1-47-0000-00222 51-06-4

DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

## ANEXO I

### **NOMBRE COMERCIAL** **NAPROXENO SODICO 220 mg** Comprimidos/Cápsulas

Venta Libre

Industria

Formula cualicuantitativa

#### **Acción terapéutica:**

Analgésico-Antiinflamatorio-Antifebril.

#### **Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio temporario de dolores de espalda, musculares, de cabeza, de dientes, dolores producidos por artritis, dolores menstruales, dolores asociados a los estados gripales y fiebre.

#### **Cómo usar este medicamento:**

Adultos y Mayores de 15 años: 1 comprimido cada 8 a 12 horas no debiendo exceder los 3 comprimidos diarios sin supervisión médica. Dosis máxima: 660 mg/día (3 comprimidos de 220 mg ).

Mayores de 65 años: Se recomienda no exceder los dos comprimidos diarios a menos que se utilice bajo supervisión e indicación médica.

Menores de 15 años: consulte con su médico.

#### **Contraindicaciones:**

Está contraindicado en pacientes que hayan tenido reacciones alérgicas al naproxeno o al ácido acetilsalicílico y a otros antiinflamatorios no esteroides y en los pacientes con úlcera péptica activa.

#### **Advertencias y precauciones:**

- No se recomienda la utilización de este producto durante un período mayor de 3 días como antifebril, ni por más de 5 días como analgésico, debiéndose consultar al médico si estos síntomas persisten por más tiempo.
- No se recomienda la administración junto con otras drogas antiinflamatorias salvo bajo prescripción médica.
- Este producto no debe ser administrado en pacientes con enfermedades gastrointestinales ni para el tratamiento sintomático del dolor de dicho origen.
- Se recomienda precaución cuando se administra este producto en pacientes con antecedentes de trastornos en la coagulación o que estén recibiendo medicamentos que interfieren con la misma, debiendo administrarse bajo supervisión médica.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

- Es conveniente tener en cuenta que cada comprimido de 220 mg contiene 20 mg de sodio.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Consulte a su médico antes de consumir naproxeno si usted padece alguna enfermedad en el estómago, intestino, hígado, riñón, corazón o algún problema en la coagulación de la sangre.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

***Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.***

#### **Interacciones con otros medicamentos.**

Este producto no debe ser tomado con otros medicamentos antiinflamatorios, incluyendo otra presentación de naproxeno o naproxeno sódico, salvo bajo indicación médica.

Si Ud. ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

#### **Reacciones adversas.**

Los efectos adversos más frecuentes son: reacciones de hipersensibilidad (rush cutáneo) dolor o malestar abdominal, constipación y náuseas, cefalea, mareos, trastornos en el sueño, trastornos auditivos y visuales, picazón y edema.

Se recomienda interrumpir el medicamento y consultar al médico si:

- Ocorre una reacción alérgica.
- Si el dolor persiste más allá de los 5 días.
- Si la fiebre permanece más allá de los 3 días.
- Si se presenta dolor de estómago.
- Si se presenta dificultad para tragar.
- Si está tomando otros medicamentos.

#### **Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

#### **Presentación:**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

**Conservación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro:

Revisión:

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4

DISPOSICION 7573



## ANEXO II

### **NOMBRE COMERCIAL** **DICLOFENAC 25 mg** Comprimidos/Cápsulas

Venta Libre

Industria

Formula cualicuantitativa

#### **Acción terapéutica:**

Analgésico-Antiinflamatorio.

#### **Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio sintomático de dolores de espalda, musculares, dolores en las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

#### **Cómo usar este medicamento:**

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido 3 veces por día (cada 8 horas). Dolores menstrual: 1 comprimido 1 ó 2 veces por día. Ingerir preferentemente el producto después de las comidas.

Dosis máxima: 75 mg/día (3 comprimidos de 25 mg ).

Mayores de 65 años: consulte con su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- Transcurridos 3 días de uso sin mejoría de la sintomatología o con empeoramiento del padecimiento, se recomienda consultar con un médico.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
- No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.

#### **Contraindicaciones:**

- Alergia conocida a algunos de los componentes de la fórmula. Ante la duda, consulte al médico.
- Personas a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas serias.
- Úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias,
- Enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón,
- Hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante,
- Tratamiento intensivo o diuréticos.
- Insuficiencia hepática, renal.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

- Embarazo o lactancia
- Menores de 15 años

**Advertencias y precauciones:**

- Si se presentaran síntomas de hipersensibilidad o alergia sin antecedentes conocidos, suspender la ingestión del producto.
- Si consume otro medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico.
- Antes de utilizar este producto conjuntamente con otros medicamentos se conveniente consultar al médico.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

***Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.***

**Reacciones adversas.**

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ej. náuseas /vómitos, diarrea/constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Todos estos síntomas, como así también otros no especificados, pueden ser atribuidos o no al uso del producto; por lo tanto, si usted presenta alguno de los mismos u otro tipo de sintomatología que le despierte sospecha, le sugerimos acudir inmediatamente al médico.

**Sobredosis**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

**Presentación:**

**Conservación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro:

Revisión:

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4

DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

### ANEXO III

#### **NOMBRE COMERCIAL** **IBUPROFENO 400 mg** Comprimidos/Cápsulas

Venta Libre

Industria

Formula cualicuantitativa:

#### **Acción terapéutica:**

Analgésico-Antifebril-Antiinflamatorio.

#### **Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

#### **Cómo usar este medicamento:**

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg ). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

#### **Contraindicaciones:**

Alergia al Ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

#### **Advertencias y precauciones:**

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. -
- Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.
- La ingesta del ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardiaca.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

***Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.***

### **Reacciones Adversas**

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

### **Interacciones con otros medicamentos.**

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

### **Sobredosis**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

### **Presentación:**

### **Conservación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro:

Revisión:

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4

DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

**NOMBRE COMERCIAL**  
**IBUPROFENO 200 MG**  
Comprimidos/Cápsulas

Venta Libre

Industria

Formula cualicuantitativa

**Acción terapéutica:**

Analgésico-Antifebril-Antiinflamatorio.

**Uso del Medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

**Cómo usar este medicamento:**

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (6 comprimidos de 200 mg ). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

**Contraindicaciones:**

Alergia al Ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

**Advertencias y precauciones:**

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. -
- Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.
- La ingesta del ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

***Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo***



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

**cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días par la fiebre.**

### **Reacciones Adversas**

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

### **Interacciones con otros medicamentos.**

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

### **Sobredosis**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

### **Presentación:**

### **Conservación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro:

Revisión:

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4

DISPOSICION 7573



**NOMBRE COMERCIAL**  
**IBUPROFENO (2%)**  
Suspensión Oral  
Uso pediátrico

Venta Libre

Industria

Formula cualicuantitativa:

**Acción terapéutica:**

Analgésico-Antifebril-Antiinflamatorio.

**Uso del medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

**Cómo usar este medicamento:**

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla.

Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.

En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

**TABLA DE DOSIFICACIÓN**

<b>Peso en Kilos</b>	<b>Edad (años)</b>	<b>Dosis (mL)</b>
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 mL
16 a 21	4 a 5	7,5 mL
21 a 27	6 a 8	10 mL
27 a 32	9 a 10	12,5 mL
Más de 32	Más de 10	15 mL

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

**Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

**Precauciones:**

Consulte con su médico en estos casos si:

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.

- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.
- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte con su médico.

**Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

#### **Advertencias:**

Salvo indicación médica:

No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.

No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

No utilizar contra el dolor de estómago.

#### **Reacciones Adversas**

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

#### **Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

#### **Conservación:**

#### **Presentación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro:



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación y Relaciones Sanitarias*  
*A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

Revisión:

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4  
DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

**NOMBRE COMERCIAL**  
**IBUPROFENO 120 mg**  
Comprimidos masticables  
Uso pediátrico

Venta Libre

Industria

Formula cualicuantitativa

**Acción Terapéutica**

Antifebril. Analgésico. Antiinflamatorio.

**Uso del medicamento. Lea detenidamente esta información.**

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

**Cómo usar este medicamento:**

A modo de orientación las dosis recomendadas son:

*Niños de 4 a 5 años (16 a 21 kg): 1 a 1 ½ comprimido cada 8 horas..*

*Niños de 6 a 8 años (21 a 27 kg): 1 ½ a 2 comprimidos cada 8 horas.*

*Niños de 9 a 10 años (27 a 32 kg): 2 comprimidos cada 8 horas.*

*Niños de 11 años en adelante (a partir de 32 kg de peso): 3 comprimidos cada 8 horas.*

**En todos los casos, no administrar más de tres veces por día.**

Niños menores de 4 años : se sugiere consultar con el médico.

Se recomienda beber un vaso con agua o alguna bebida sin alcohol después de su administración.

Los comprimidos masticables pueden ser masticados o disueltos lentamente en la boca. También pueden ser administrados disueltos en un poco de agua o bebidas sin alcohol. Los niños mayores y los adultos con buena deglución, pueden ingerirlos enteros.

**Contraindicaciones**

No utilizar si es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios.

**Precauciones y Advertencias**

- No usar si el envase está abierto o dañado.
- No tomar por más de 5 días para calmar dolores ni por más de 3 días para bajar la fiebre a menos que sea indicado por un médico. Si el dolor o la fiebre persisten o se agravan, si se presentan nuevos síntomas o si el área dolorida está roja o hinchada, consulte al médico.
- Si se encuentra bajo tratamiento médico debido a alguna afección grave, consulte al médico antes de ingerir este producto.
- Al igual que ocurre con la aspirina, o el paracetamol, si surge una afección que requiere la administración de medicamentos venta bajo receta, o si ha tenido algún efecto secundario por ingerir cualquier analgésico de venta libre, no tome este producto, sin antes



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

consultar al médico.

- Si experimenta algún síntoma inusual o que no parece relacionado a la afección por la cuál está tomando este producto, consulte al médico antes de continuar su administración.

#### **Interacciones medicamentosas:**

La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos pero también tóxicos.

**Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

#### **Reacciones Adversas**

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria y/o agranulocitosis.

#### **Sobredosis**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.(011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

#### **Conservación:**

#### **Presentación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado Nro:

Revisión:

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4

DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

#### ANEXO IV

### **NOMBRE COMERCIAL ASPIRINA 0.50 gr Comprimidos**

Venta Libre

Industria

Formula Cualicuantitativa

#### **Acción Terapéutica:**

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril

#### **Uso del Medicamento: Lea detenidamente esta Información**

- Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, musculares o de espalda, dolores articulares.
- También está indicado para el alivio sintomático del resfriado y síndrome gripal que se acompañen de mal estado general y/o fiebre.
- Para reducir la fiebre.

#### **Como usar este medicamento:**

Esta presentación se administra por vía oral.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

- *Adultos y mayores de 15 años:* se sugiere 1 comprimido cada 6 horas .
- *Dosis máxima diaria:* 6 comprimidos por día.
- No tomar mas de la dosis máxima indicada (6 comp /dia)

#### **Advertencias y precauciones:**

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico.

Consultar al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días ; si se observan empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consultar al médico inmediatamente.

No administrar en menores de 15 años en caso de **SÍNTOMAS DE GRIPE** o



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

**VARICELA** ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar **SÍNDROME DE REYÉ**. Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos. Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas consultar con su médico.

No usar este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.

Si padece asma; diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte a su médico.

SI USTED ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, O ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

**SOBREDOSIS:**

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777  
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

**Conservación:**

**Presentación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio De Salud  
Certificado N°:

Revisión:     /     /

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4  
DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

NOMBRE COMERCIAL  
**ASPIRINA 650 mg**  
**Comprimidos**

Venta Libre

Industria

**Formula Cualicuantitativa**

**Acción terapéutica:**

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril

**Uso del medicamento: lea detenidamente esta información**

- Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, musculares o de espalda, dolores articulares.
- También está indicado para el alivio sintomático del resfriado y síndrome gripal que se acompañen de mal estado general y/o fiebre.
- Para reducir la fiebre.

**Como usar este medicamento:**

Esta presentación se administra por vía oral.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

- *Adultos:* se sugiere 1 comprimido cada 6 horas .
- *Dosis máxima diaria:* 4 comprimidos por día.
- No tomar más de la dosis máxima indicada(4 comp /día)

**Advertencias y precauciones:**

Este medicamento no debe administrarse menores de 18 años sin consultar al médico.

Consultar al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días ; si se observan empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consultar al médico inmediatamente

No administrar en menores de 15 años en caso de **SÍNTOMAS DE GRIPE o VARICELA** ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar **SÍNDROME DE REYÉ**.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas consultar con su médico.

No usar este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.

Si padece asma; diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte a su médico.

SI USTED ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, O ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.

**Reacciones adversas:**

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

**Interacciones medicamentosas**

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

**Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777  
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

**Conservación:**

**Presentación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD

Certificado N°:revisión: / /

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4

DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

NOMBRE COMERCIAL  
**ASPIRINA 81/100 mg**  
Comprimidos

Venta Libre

Industria

**Formula Cualicuantitativa**

**Acción terapéutica:**

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril.  
Antiagregante plaquetario.

**Uso del medicamento: lea detenidamente esta información**

**ADULTOS:**

Previo diagnóstico médico, está indicado en adultos como antiagregante plaquetario para la prevención primaria de un primer infarto en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, etc.

**NIÑOS:**

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados tales como dolores de cabeza y dentición, y para bajar la fiebre.

**Como usar este medicamento:**

Esta presentación se administra por vía oral.  
Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

**ADULTOS:**

Como antiagregante plaquetario un comprimido diario o la dosis sugerida por su médico.

**NIÑOS:**

Dosis: 50 mg/kg/día.

Edad (años)	Peso (kg)	Dosis
2 a 4 años	14 a 16	2 comprimidos 3 veces por día
4 a 6 años	17 a 20	3 comprimidos 3 veces por día
6 a 9 años	21 a 29	4 comprimidos 3 veces por día
9 a 12 años	30 a 38	5 comprimidos 3 veces por día

En niños menores de 2 años se deberá consultar al médico.



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

### **Advertencias y precauciones:**

Este medicamento no debe administrarse menores de 2 años sin consultar al médico. Consultar al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días ; si se observan empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consultar al médico inmediatamente

No administrar en menores de 15 años en caso de **SÍNTOMAS DE GRIPE o VARICELA** ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar **SÍNDROME DE REYÉ**.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas consultar con su médico.

No usar este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.

Si padece asma; diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte a su médico.

**SI USTED ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, O ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.**

### **Reacciones adversas:**

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal ,alteraciones sanguíneas.

### **Interacciones medicamentosas**

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

### **Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777  
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

**Conservación:**

**Presentaciones:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.  
Certificado N°:

Revisión:    /    /

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4  
DISPOSICION 7573



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.

2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo

NOMBRE COMERCIAL  
**ASPIRINA 325 mg**  
**Comprimidos**

Venta Libre

Industria

**Formula Cualicuantitativa**

**Acción terapéutica:**

Analgésico, antiinflamatorio, antifebril.  
Antiagregante plaquetario.

**Uso del medicamento: lea detenidamente esta información**

**ADULTOS:**

Previo diagnóstico médico, está indicado en adultos como antiagregante plaquetario para la prevención primaria de un primer infarto en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, etc.

**NIÑOS:**

Este medicamento está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados tales como dolores de cabeza y dentición, y para bajar la fiebre.

**Como usar este medicamento:**

Esta presentación se administra por vía oral.  
Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

**ADULTOS:**

Como antiagregante plaquetario un comprimido diario o la dosis sugerida por su médico.  
*Para las otras indicaciones:* Adultos y niños mayores de 12 años, 1 comprimido cada 6-8 horas. Dosis máxima: 6 comprimidos por día.

**Advertencias y precauciones:**

Este medicamento no debe administrarse menores de 12 años sin consultar al médico.  
Consultar al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días ; si se observan empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

consultar al médico inmediatamente

No administrar en menores de 15 años en caso de **SÍNTOMAS DE GRIPE o VARICELA** ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar **SÍNDROME DE REYÉ**.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas consultar con su médico.

No usar este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico.

Si padece asma; diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte a su médico.

SI USTED ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, O ESTÁ EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE MEDICAMENTO.

**Reacciones adversas:**

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

**Interacciones medicamentosas**

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

**Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247  
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777  
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

**Conservación:**

**Presentación:**

**Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación y Relaciones Sanitarias  
A.N.M.A.T.*

*2006 Año de Homenaje a Dr. Ramón Carrillo*

**niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico**

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.  
Certificado N°:

Revisión:     /     /

Expediente N° 1-47-0000-0022251-06-4  
DISPOSICION 7573